



名古屋市の定期接種(無料)予防注射



中京病院 小児科 H28.10

予防接種の種類 公費券の対象年齢	標準接種年齢	実施回数	他の 予防接種 までの間隔	自費 料金
※BCG 1歳の誕生日の前日まで	生後3(4)ヶ月	1回 (3・4ヶ月検診時、保健所にて接種)	4 週間	5,400
インフルエンザ菌b型 (ヒブワクチン) 生後2ヶ月以上5歳未満	生後2ヶ月～6ヶ月で 開始 生後7ヶ月～1歳未満で 開始 1歳～5歳未満で 開始	合計4回 4～8週間隔で生後12ヶ月までに3回接種 3回目接種から7～13ヶ月後に4回目接種 合計3回 4～8週間隔で生後12ヶ月までに2回接種 2回目接種から7～13ヶ月後に3回目接種 1回	1 週間	(1回) 8,640
小児用肺炎球菌 (プレベナー13) 生後2ヶ月以上5歳未満	生後2ヶ月～6ヶ月で 開始 生後7ヶ月～1歳未満で 開始 1歳～2歳未満で 開始 2歳～9歳で開始	【初回接種：最大3回、追加接種：1回】 4週間隔で生後24ヶ月までに3回接種。 ただし2回目の接種が生後12ヶ月を超えた場合は 3回目の接種不可。 初回最終接種から60日以上あけ、 かつ生後12ヶ月以降 ＜標準：12～15ヶ月＞に追加接種1回 【初回接種：2回、追加接種：1回】 4週間隔で生後24ヶ月までに2回接種。 2回目から60日以上あけ、かつ生後12ヶ月以降に 追加接種1回 合計2回 (60日以上の間隔で2回接種) 1回	1 週間	(1回) 10,800
B型肝炎(ビームゲン) 1歳の誕生日の前日まで H28.10.1開始・対象H28.4.1生～	生後2ヶ月～1歳未満	4週間以上の間隔をあけて2回 1回目の接種から20～24週後に1回の計3回	1 週間	(1回) 8,640
4種混合 ジフテリア(D) 百日咳(P) 破傷風(T) 不活化ポリオ 生後3ヶ月～90ヶ月未満	生後3ヶ月～12ヶ月 初回接種終了後 12ヶ月～18ヶ月	【第1期】 3～8週間隔で 3回 【第1期追加】 第1期初回の3回目を接種後6ヶ月以上経過 1回	1 週間	(4種・1回) 10,800
※ジフテリア・破傷風(DT) 11歳～13歳未満	小学6年生	【第2期】 1回		(1回) 4,320
麻疹・風疹混合(MR) 【第1期】生後12ヶ月～24ヶ月未満 【第2期】小学校就学前年度	生後12ヶ月以降 できるだけ早期 小学校就学前年度	【第1期】 1回 【第2期】 1回	4 週間	(1回) 10,800
水痘 生後12ヶ月以上3歳未満	1回目を 生後12か月～15か月	合計2回 (標準的には6か月から12か月の間隔を空けて) ※最低3ヶ月以上の間隔が必要	4 週間	(1回) 8,640
日本脳炎 H8.4.2～H19.4.1生まれ の方でワクチン接種が未完了 の場合はお問い合わせください (20歳未満) 【第1期】生後6ヶ月～90ヶ月未満 【第2期】9歳～13歳未満	3歳 初回接種から 6ヶ月以上経過(標準：4歳) 小学4年生	【第1期初回】 1～4週の間隔で2回接種する 【第1期追加】 第1期初回接種の翌年に1回接種する 【第2期】 1回	1 週間	(1回) 5,400
子宮頸がんワクチン 小学6年～高校1年相当年齢	13歳となる年度	※ サーバリックス 合計3回(1回目接種から1ヶ月後と6か月後) ※ ガーダシル 合計3回(1回目接種から2か月後と6ヶ月後)	1 週間	(1回) 15,120

当日母子手帳忘れの方は接種が行えません ご注意ください