

院内フォーミュラリ（スタチン：HMG-CoA還元酵素阻害薬）

第一選択薬

第二選択薬

ロスバスタチンOD錠2.5mg

アトルバスタチンOD錠10mg
プラバスタチン錠5mg

第一選択薬：最も薬価が低い水溶性ストロングスタチン、シクロスポリン併用禁忌

第二選択薬：アトルバスタチン＝脂溶性ストロングスタチン、マヴィレット配合錠併用禁忌
プラバスタチン＝水溶性スタンダードスタチン、併用禁忌なし

（参考）スタチン比較表

成分名 (先発品名称)	適応症	用法・用量	特性	代謝・相互作用
ロスバスタチン (クレストール)	①高コレステロール血症 ②家族性高コレステロール血症	1日1回 経口投与 1回2.5mg (最大：20mg)	<ul style="list-style-type: none"> 水溶性ストロングスタチン OD錠の発売がある 	<ul style="list-style-type: none"> CYPで代謝されないため、相互作用が少ない (シクロスポリン併用禁忌)
ピタバスタチン (リバロ)		1日1回 経口投与 1回1～2mg (最大：4mg)	<ul style="list-style-type: none"> 脂溶性ストロングスタチン OD錠が発売がある 	
アトルバスタチン (リピートル)		1日1回 経口投与 1回10mg (最大：①20mg、②40mg)	<ul style="list-style-type: none"> CYP3A4で代謝されるため、相互作用に注意 (マヴィレット配合錠併用禁忌) 	
プラバスタチン (メバロチン)	①高脂血症 ②家族性高コレステロール血症	1日1または2回 経口投与 1回10mg (最大：20mg/日)	<ul style="list-style-type: none"> 水溶性スタンダードスタチン 普通錠のみの発売 	<ul style="list-style-type: none"> CYPで代謝されないため、相互作用が少ない
シンバスタチン (リポバス)	①高コレステロール血症 ②家族性高コレステロール血症	1日1回 経口投与 1回5mg (最大：20mg)	<ul style="list-style-type: none"> 脂溶性スタンダードスタチン 普通錠のみの発売 	<ul style="list-style-type: none"> CYP3A4で代謝
フルバスタチン (ローコール)		1日1回 夕食後経口投与 1回20～30mg (最大：60mg)		<ul style="list-style-type: none"> CYP2C9で代謝