

泌尿器腫瘍

尿路上皮癌

カルボプラチン+ゲムシタビン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8
ゲムシタビン 生理食塩液100mL	1000mg/m ²	点滴	30分	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓	

尿路上皮癌 バベンチオ維持療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
バベンチオ 生理食塩液250mL	10mg/kg	点滴	60分	↓

尿路上皮癌 キイトルーダ[®]療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ [®] 生理食塩液100mL	200mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル42日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ [®] 生理食塩液100mL	400mg/Body	点滴	30分	↓

前立腺癌 ドセタキセル療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-21
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	75mg/m ²	点滴	60分	↓	
プレドニゾン5mg または デカドロン0.5~1mg	1日2回 または 1日1回	内服			→

尿路上皮癌 ジェブタナ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-21
ジェブタナ 生理食塩液250mL	25mg/m ²	点滴	60分	↓	
プレドニゾン	10mg/day 1日2回	内服			→

腎細胞癌 トーリセル療法

インターバル7日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
トーリセル 生理食塩液250mL	25mg/Body	点滴	30分	↓

腎細胞癌 オプジーボ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	480mg/Body	点滴	30分	↓

腎細胞癌

オプジーボ+ヤーボイ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg/Body	点滴	30分	↓
ヤーボイ 生理食塩液100mL	1mg/kg	点滴	30分	↓

腎細胞癌

キイトルーダ+インライタ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-21
キイトルーダ 生理食塩液100mL	200mg/Body	点滴	30分	↓	
インライタ	5mg/回 1日2回	内服			→

インライタは患者の状態により適宜増減するが、最大20mg/dayまで増量できる

腎細胞癌

バベンチオ+インライタ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
バベンチオ 生理食塩液100mL	10mg/kg	点滴	60分	↓	
インライタ	5mg/回 1日2回	内服			→

インライタは患者の状態により適宜増減するが、最大20mg/dayまで増量できる

腎細胞癌

オプジーボ+カボメティクス療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg/body	点滴	30分	↓	
カボメティクス	40mg/回 1日1回	内服			→