

婦人科腫瘍

子宮頸癌

3週毎

パクリタキセル+カルボプラチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
パクリタキセル 5%ブドウ糖液500mL	175mg/m ²	点滴	180分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓

子宮頸癌

パクリタキセル+カルボプラチン+アバスチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
パクリタキセル 5%ブドウ糖液500mL	175mg/m ²	点滴	180分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓

子宮頸癌 毎週

パクリタキセル+カルボプラチン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
パクリタキセル 5%ブドウ糖液250mL	80mg/m ²	点滴	120分	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	2mg/GFR+25	点滴	30分	↓	↓	↓

子宮頸癌

ドセタキセル+カルボプラチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	60mg/m ²	点滴	60分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓

子宮頸癌 イリノテカン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	90分	↓	↓	↓

子宮頸癌

シスプラチン+放射線療法

インターバル7日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
シスプラチン 生理食塩液250mL	40mg/m ²	点滴	60分	↓

子宮頸癌 アバスチン維持療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓

子宮体癌

3週毎

パクリタキセル+カルボプラチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
パクリタキセル 5%ブドウ糖液500mL	180mg/m ²	点滴	180分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓

子宮体癌 毎週

パクリタキセル+カルボプラチン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
パクリタキセル 5%ブドウ糖液250mL	80mg/m ²	点滴	120分	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	2mg/GFR+25	点滴	30分	↓	↓	↓

子宮体癌 ドセタキセル+カルボプラチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	60mg/m ²	点滴	60分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓

卵巣癌

3週毎

パクリタキセル+カルボプラチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
パクリタキセル 5%ブドウ糖液500mL	180mg/m ²	点滴	180分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓

卵巣癌 毎週

パクリタキセル+カルボプラチン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
パクリタキセル 5%ブドウ糖液250mL	60mg/m ²	点滴	120分	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	2mg/GFR+25	点滴	30分	↓	↓	↓

卵巣癌

パクリタキセル+カルボプラチン+アバスチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
パクリタキセル 5%ブドウ糖液500mL	175mg/m ²	点滴	180分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓

卵巣癌

ドセタキセル+カルボプラチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	70mg/m ²	点滴	60分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓

卵巣癌

ドセタキセル+カルボプラチン+アバスチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	75mg/m ²	点滴	60分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓

卵巣癌

ドセタキセル+ゲムシタビン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8
ゲムシタビン 生理食塩液100mL	800mg/m ²	点滴	30分	↓	↓
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	70mg/m ²	点滴	60分	↓	

卵巣癌 ドキシル療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ドキシル 5%ブドウ糖液250mL	50mg/m ²	点滴	120分	↓

卵巣癌

ドキシル+カルボプラチン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ドキシル 5%ブドウ糖液250mL	30mg/m ²	点滴	120分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓

卵巣癌

ゲムシタビン+カルボプラチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8
ゲムシタビン 生理食塩液100mL	1000mg/m ²	点滴	30分	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	4mg/GFR+25	点滴	60分	↓	

卵巣癌 ハイカムチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1-5
ハイカムチン 生理食塩液100mL	1.2mg/m ²	点滴	30分	↓

卵巣癌

ドキシル+アバスチン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 15
ドキシル 5%ブドウ糖液250mL	40mg/m ²	点滴	120分	↓	
アバスチン 生理食塩液100mL	10mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓	↓

卵巣癌 アバスチン維持療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓

卵巣癌

リムパーザ+アバスチン維持療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-21
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓	
リムパーザ	300mg/回 1日2回	内服			→