

下部消化管腫瘍

大腸癌 mFOLFOX6療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌

mFOLFOX6+アービタックス療法(2回目以降)

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8
アービタックス 生理食塩液250mL	250mg/m ²	点滴	60分	↓	↓
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m ²	点滴	120分	↓	
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓	
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→	

大腸癌

mFOLFOX6+ベクティビックス療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ベクティビックス 生理食塩液250mL	6mg/kg	点滴	60分	↓
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌 FOLFIRI療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌

FOLFIRI+アバスチン療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
アバスチン 生理食塩液100mL	5mg/kg	点滴	30分 (初回90分、 2回目60分)	↓
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌

FOLFIRI+アービタックス療法（2回目以降）

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8
アービタックス 生理食塩液250mL	250mg/m ²	点滴	60分	↓	↓
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	120分	↓	
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓	
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→	

大腸癌

FOLFIRI+ベクティビックス療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ベクティビックス 生理食塩液250mL	6mg/kg	点滴	60分	↓
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌

mFOLFIRI+サイラムザ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
サイラムザ 生理食塩液250mL	8mg/kg	点滴	30分 (初回60分)	↓
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌

mFOLFOXIRI療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	60分	↓
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌

mFOLFOXIRI+アバスチン療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
アバスチン 生理食塩液100mL	5mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	60分	↓
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

大腸癌

SOX+アバスチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
アバスチン 生理食塩液100mL	7.5mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓	
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	120分	↓	
エスワン	40mg/m ² /回 1日2回	内服			→

大腸癌 IRIS療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14	Day 15
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	125mg/m ²	点滴	90分	↓		↓
エスワン	40mg/m ² / 回 1日2回	内服			→	

大腸癌 CapeOX療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	130mg/m ²	点滴	120分	↓	
カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服			→

大腸癌

CapeOX+アバスチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
アバスチン 生理食塩液100mL	7.5mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)		
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	130mg/m ²	点滴	120分	↓	
カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服			→

大腸癌 CapIRI+アバスチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
アバスチン 生理食塩液100mL	7.5mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)		
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	90分	↓	
カペシタビン	1600mg/m ² /回 1日2回	内服			→

大腸癌 ロンサーフ+アバスチン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-5	Day 8-12	Day 15
アバスチン 生理食塩液100mL	5mg/kg	点滴	30分 (初回90分 2回目60分)	↓			↓
ロンサーフ	35mg/m ² /回	内服			→	→	

大腸癌

アービタックス+ビラフトビ+メクトビ療法(2回目以降)

インターバル7日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-7
アービタックス 生理食塩液250mL	250mg/m ²	点滴	60分	↓	
ビラフトビ	300mg/回 1日1回	内服			→
メクトビ	45mg/回 1日2回	内服			→