

肝・胆・脾腫瘍

肝細胞癌

テセントリク＋アバスチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
テセントリク 生理食塩液250mL	1200mg/Body	点滴	30分 (初回60分)	↓
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分 (初回90分、2回目60分)	↓

肝細胞癌 サイラムザ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
サイラムザ 生理食塩液250mL	8mg/kg	点滴	30分 (初回60分)	↓

胆道癌

シスプラチン+ゲムシタビン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8
シスプラチン 生理食塩液250mL	25mg/m ²	点滴	60分	↓	↓
ゲムシタビン 生理食塩液150mL	1000mg/m ²	点滴	30分	↓	↓

膵臓癌 ゲムシタビン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
ゲムシタビン 生理食塩液100mL	1000mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓

膵臓癌

mFOLFIRINOX療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	85mg/m ²	点滴	120分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	150mg/m ²	点滴	90分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして 2日用ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→

膵臓癌

アブラキサン+ゲムシタビン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
アブラキサン 生理食塩液50mL	125mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓
ゲムシタビン 生理食塩液100mL	1000mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓

膵臓癌 オニバイド＋5FU＋I-LV療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オニバイド 生理食塩液500mL	70mg/m ²	点滴	90分	↓
レボホリナート 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	120分	↓
5-FU 生理食塩液を加えて 総量100mLとして2日用 ポンプを使用	2400mg/m ²	点滴	46時間	→