

# 院内フォーミュラリ（慢性便秘症治療薬）

	第一選択薬	第二選択薬
成人	マグネシウム製剤	リンゼス錠0.25mg モビコール配合内用剤LD
小児	モビコール配合内用剤LD	ラクツロースシロップ65%

頓用または短期使用限定

センノシド錠12mg、ラキソベロン錠2.5mg・ピコスルファートナトリウム内用液0.75%  
新レシカルボン坐剤、テレミンソフト坐剤2mg、グリセリン浣腸液50%

※高齢者・腎機能低下患者にマグネシウム製剤を使用する場合は定期的に血清Mg値を測定すること。

商品名 (一般名名称)	モビコール配合内用剤LD (ポリエチレングリコール)	マグミット錠 (酸化マグネシウム)	リンゼス錠 (リナクロチド)	ラクツロースシロップ (ラクツロース)	センノシド錠 (センノシド)	ラキソベロン錠 ピコスルファートNa内用液 (ピコスルファートナトリウム)	
						【錠】 (成人) 1回2~3錠 1日1回 (小児) <7~15歳> 1日2錠 1日1回	【内用液】 (成人) 1回10~15滴 1日1回 (小児) 年齢に応じて滴数指摘
用法・用量	1回1~2包 1日1~3回 (12歳以上は1日最大6包)	1日0.5g~2gを数回に分ける or 就寝前に1回	1回1~2錠 1日1回 食前	(成人) 1日30mL~60mL 1日2回 (小児) 1日0.5mL~2mL/kg 1日3回	1回1~2錠 1日1回 就寝前 (1回最大4錠)	【錠】 (成人) 1回2~3錠 1日1回 (小児) <7~15歳> 1日2錠 1日1回	【内用液】 (成人) 1回10~15滴 1日1回 (小児) 年齢に応じて滴数指摘
備考	腎機能低下時でも使用可 妊婦に使用可 2歳以上の小児に適応	小児に適応ないが広く使用されている 安価で用量調節しやすい 妊婦に使用可	腹痛優位の便秘に優先使用 妊婦には有益性投与 食後投与で下痢頻発	成人の適応は「産婦人科術後」のみ 腎機能低下時にも使用可	長期連用で耐性	長期連用で耐性 内用液は1歳未満でも使用可	