院内フォーミュラリ（抗インフルエンザ薬）

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
インフルエンザウイルス感染症	オセルタミビルカプセル75mg※1 オセルタミビルドライシロップ3%※1	イナビル吸入粉末剤20mg※2 ゾフルーザ錠10mg/20mg※3
	経口投与、吸入ができない重症例	
	ラピアクタ点滴静注用バイアル150mg	

※1：多くの使用成績があること、後発品があり最も安価なため、第一選択とする。
※2：対象患者にとって単回投与の有益性が高い場合には、吸入操作が可能であれば選択することを推奨する。
※3：12歳未満の患児への投与は「日本小児科学会：2025/26シーズンのインフルエンザ治療・予防指針」を参照。

JCHO中京病院
2026年10月作成


～　抗インフルエンザ薬一覧　～

製品名		**オセルタミビル**ｶﾌﾟｾﾙ75mg **オセルタミビル**ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ3% （ドライシロップ1ｇ中 オセルタミビル30mｇ含有） 先発品：タミフル	**ゾフルーザ**錠 10mg/20mg	**ゾフルーザ**顆粒 2%分包 （顆粒0.5g/包中 バロキサビル10mg含有）	**リレンザ**5mg	**イナビル** 吸入粉末剤20mg	**ラピアクタ** 点滴静注用バイアル 150mg
一般名		オセルタミビル	バロキサビル		ザナミビル	ラニナミビル	ペラミビル
薬価		75mg 1ｶﾌﾟｾﾙ 108.0円 3% 1g　75.9円	10mg 1錠 1,535.4円 20mg 1錠 2,438.8円	1包 1,666.2円	5mｇ 20 ﾌﾞﾘｽﾀｰ 2,028.0円	20mｇ 1ｷｯﾄ 1,484.9円	150mg 15mL 1瓶 3,182.0円
採用区分		院内・院外	院内・院外	院外	院外	院内・院外	院内
投与量	成人	2ｶﾌﾟｾﾙ／【分2】 5日分	【12歳以上】 80kg未満 20mg 2錠／【分1】 80kg以上 20mg 4錠／【分1】 【12歳未満】※ 10kg以上20kg未満 10mg 1錠／【分1】 20kg以上40kg未満 20mg 1錠／【分1】 40kg以上 20mg 2錠／【分1】 （すべて単回投与）	【12歳以上】 80kg未満 顆粒　4包／【分1】 80kg以上 顆粒　8包／【分1】 【12歳未満】※ 10kg未満 顆粒　50mg／kg 10kg以上20kg未満 顆粒　1包／【分1】 20kg以上40kg未満 顆粒　2包／【分1】 40kg以上 顆粒　4包／【分1】 （すべて単回投与）	20 ﾌﾞﾘｽﾀｰ 1日2回 1回2吸入 （5日間）	【10歳以上】 2 ｷｯﾄ 1日1回 1回4吸入 （単回投与） 【10歳未満】 1 ｷｯﾄ 1日1回 1回2吸入 （単回投与）	300mgを15分以上かけて単回点滴静注 ※重症化するおそれのある患者の場合は倍量投与
	小児	オセルタミビルとして 4mg／kg／【分2】 5日分 1歳未満の患児の場合 6mg／kg／【分2】 5日分					10mg／kgを15分以上かけて単回点滴静注
腎機能障害時の投与量		10<Ccr≦30 1ｶﾌﾟｾﾙ／【分1】　5日分 透析患者 1ｶﾌﾟｾﾙ／【分1】　1日分	減量不要		減量不要	減量不要	30≦Ccr＜50 1日1回 100mg 10≦Ccr＜30 1日1回 50mg
妊婦 授乳婦		○ ○	× ×		○ ○	△ ○	△ ○
予防投与 **※自己負担**	成人	1ｶﾌﾟｾﾙ／【分1】7～10日分 10<Ccr≦30 1ｶﾌﾟｾﾙ／【分1】 隔日投与 透析患者 初回 1ｶﾌﾟｾﾙ 2回透析後 1ｶﾌﾟｾﾙ	治療量と同様 10mg錠には適応がない ↓ 20kg未満の 小児には投与不可 【12歳未満】※		20 ﾌﾞﾘｽﾀｰ 1日1回 1回2吸入 （10日間）	【10歳以上】2 ｷｯﾄ 1日1回 1回4吸入（単回） Or 1日1回 1回2吸入（2日間） 【10歳未満】1 ｷｯﾄ 1日1回 1回2吸入（単回）	—
	小児	2mg/kg/【分1】7～10日分 1歳未満の患児は適応外					

[各製品添付文書等（2026年10月現在）より作成]　　JCHO中京病院　薬剤部

成人

抗インフルエンザ薬 院内フォーミュラリフローチャート




参考：各種薬剤添付文書
「ゾフルーザ使用についての提言 2025/26シーズンにむけて」
中京病院インフルエンザ診療マニュアル

2026年10月 JCHO中京病院

小児

抗インフルエンザ薬 院内フォーミュラリフローチャート



※1　生後2週以降の新生児が対象
※2　6歳未満は吸入困難と判断する
※3　6歳未満は積極的に推奨しない
　　(1～5歳においてB型では考慮可)
※4　6～11歳ではB型での使用提案
※5　生後1か月以降の乳児に適応あり

参考：各種薬剤添付文書
　　日本小児科学会「インフルエンザ治療・予防指針 2025/26」

2026年10月 JCHO中京病院